

ALLEGATO 1

**TABELLA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI AI  
DIVERSI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA**

*(Art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge  
2 ottobre 2007, n. 160)*

**LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA:  
0,5 GRAMMI per LITRO**

| Concentrazione di alcol nel sangue (g/L)                         | Sensazioni più frequenti (*)   | Effetti progressivi e abilità compromesse (*)  |
|--|--|--|
| 0  | Nessuna  | Nessuna  |
| 0.1-0.2  | Iniziale sensazione di ebbrezza.<br>Iniziale riduzione delle inibizioni e del controllo.             | Affievolimento della vigilanza, attenzione e controllo.<br>Iniziale riduzione del coordinamento motorio.<br>Iniziale riduzione della visione laterale.<br>Nausea.  |
| 0.3-0.4  | Sensazione di ebbrezza.<br>Riduzione delle inibizioni, del controllo e della percezione del rischio. | Riduzione delle capacità di vigilanza, attenzione e controllo.<br>Riduzione del coordinamento motorio e dei riflessi.<br>Riduzione della visione laterale.<br>Vomito.  |
| <b>0.5 g/L : LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA</b> |  |  |
| 0.5-0.8  | Cambiamenti dell'umore.<br>Nausea, sonnolenza.<br>Stato di eccitazione emotiva.                      | Riduzione della capacità di giudizio.<br>Riduzione della capacità di individuare oggetti in movimento e della visione laterale.<br>Riflessi alterati.<br>Alterazione delle capacità di reazione agli stimoli sonori e luminosi.<br>Vomito. |

|          |   |  |
|----------|---|--|
| 0.9-1.5  | Alterazione dell'umore.<br>Rabbia.<br>Tristezza.<br>Confusione mentale,<br>disorientamento. | Compromissione della<br>capacità di giudizio e di<br>autocontrollo.<br>Comportamenti<br>socialmente inadeguati.<br>Linguaggio mal articolato.<br>Alterazione dell'equilibrio.<br>Compromissione della<br>visione, della percezione di<br>forme, colori, dimensioni.<br>Vomito. |
| 1.6-3.0  | Stordimento.<br>Aggressività.<br>Stato depressivo.<br>Apatia.<br>Letargia.                  | Compromissione grave<br>dello stato psicofisico.<br>Comportamenti aggressivi<br>e violenti.<br>Difficoltà marcata a stare<br>in piedi o camminare.<br>Stato di inerzia generale.<br>Ipotermia.<br>Vomito.  |
| 3.1- 4.0 | Stato di incoscienza.   | Allucinazioni.<br>Cessazione dei riflessi.<br>Incontinenza.<br>Vomito.<br>Coma con possibilità di<br>morte per soffocamento da<br>vomito.  |
| Oltre 4  | Difficoltà di respiro,<br>sensazione di<br>soffocamento.<br>Sensazione di morire.           | Battito cardiaco rallentato.<br>Fame d'aria.<br>Coma.<br>Morte per arresto<br>respiratorio.  |

Fonte: riadattato dal testo dell' Advisory Committee and NIAAA scientists, 2003

(\*) A parità di quantità di alcol assunto, sensazioni ed effetti sono estremamente variabili da soggetto a soggetto, con possibilità di manifestazioni anche opposte tra di loro; in tabella sono riportati sensazioni ed effetti più frequentemente rilevati.

COPIA